

# ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ И/ИЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

**Введение.** Изменение подходов к ведению онкологических больных заметно улучшило результаты лечения и качество жизни пациентов в последнее десятилетие. При этом важная роль отводится поддерживающей терапии, которая включает в себя и нутритивную поддержку.

Прогрессирование опухолевого процесса часто сопровождается развитием недостаточности питания, что проявляется в снижении массы тела, слабости, уменьшении физической активности. По данным отчета Европейского общества парентерального и энтерального питания (ESPEN), частота недостаточности питания у онкологических больных колеблется от 46 до 88% и в своем максимальном проявлении (синдроме анорексии-кахексии) является непосредственной причиной смерти.

**Нутритивная поддержка** (*nutrition support*), проводится с лечебной целью в период повышенной потребности организма в энергетическом и пластическом обеспечении.

## ДОКАЗАННЫЕ ЭФФЕКТЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Удовлетворение потребностей организма макронутриентами (белки, жиры, углеводы), микронутриентами (витамины, микроэлементы) и фармаконутриентами (антиоксиданты, глутамин, аргинин, омега-3 жирные кислоты и др.) «В»<sup>1</sup>.
2. Восстановление азотистого баланса в организме «В».<sup>1</sup>
3. Сокращение частоты раневой инфекции и нозокомиальных инфекционных осложнений «В»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Уровни доказательности:

«А» высокий – (мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований)

«В» средний – (когортные исследования и исследования типа случай-контроль)

«С» низкий – (неконтролируемые исследования и консенсусы специалистов)

<sup>2</sup> Уровни доказательности:

«А» высокий – (мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований)

«В» средний – (когортные исследования и исследования типа случай-контроль)

«С» низкий – (неконтролируемые исследования и консенсусы специалистов)

4. Сокращение частоты и тяжести послеоперационных осложнений, включая полиорганную недостаточность (ПОН) «С».
5. Уменьшение длительности пребывания больного в палате интенсивной терапии, а также длительности ИВЛ и времени госпитализации «В».
6. Снижение летальности «В».
7. Повышение качества жизни «С».
8. Снижение расхода дорогостоящих лекарств и препаратов крови «С».
9. Профилактика и лечение рак – ассоциированной недостаточности питания «С».
10. Профилактика и лечение недостаточности питания на фоне химио- и химиолучевой терапии «С».
11. Возможность проведения полноценной цитотоксической химиотерапии и/или лучевой терапии, а также улучшение их переносимости «С».

Показания к нутритивной поддержке опираются на современные представления о недостаточности питания.

Для диагностики степени недостаточности питания предложено много критериев, из которых наиболее распространенными являются:

- произвольная потеря массы тела;
- адекватность приема пищи за последний период;
- индекс массы тела;
- тяжесть заболевания.

Однако для пациентов, получающих химио- и/или лучевую терапию, учитываются дополнительные факторы:

- рост, вес и темпы потери массы тела;
- расположение первичной опухоли и метастазов;
- общее состояние;
- наличие отеков;
- физическая активность;
- характер проводимого лечения и его побочные явления: тошнота, рвота, потеря аппетита, мукозиты, стоматиты, нарушения вкуса и обоняния, сухость во рту, затруднения жевания или проглатывания, запор, диарея;
- влияние опухоли на функцию органов пищеварения;
- режим питания и аппетит;
- лабораторные показатели.

## **СКРИНИНГ И МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ**

Своевременное выявление пациентов из группы риска нарушения статуса питания, позволяет защитить больного от прогрессирующей потери массы тела и развития рефрактерной кахексии. Скрининг и мониторинг недостаточности питания должны

проводиться на протяжении всего времени лечения онкологического больного. С этой целью можно использовать:

- 1) Индекс нарушения питания по Vuzby G. P. (ИНР), который рассчитывается по формуле:

ИНР > 97,5 – нет нутритивной недостаточности

ИНР от 83,5 до 97,5 – средняя степень недостаточности питания

$$\text{ИНР} = 1,519 \times \text{уровень Альбумина (г/л)} \times \frac{\text{М тела (кг) исходная}}{\text{М тела (кг) в наст. момент}}$$

ИНР < 83,5 – тяжелая степень недостаточности питания

- 2) Согласно рекомендациям Европейского общества химиотерапевтов (ESMO) 2008, можно использовать бальную шкалу (А, Б, В, Г):

- А) Отметили ли Вы (самопроизвольное, спонтанное) снижение массы тела за последнее время?

Нет – 0 баллов

Да – 2 балла

- Б) Если ДА, то на сколько?

1-5 кг – 1 балл

6-10 кг – 2 балла

11-15 кг – 3 балла

Более 15 кг – 4 балла

Неизвестно – 2 балла

- В) Имеете ли вы снижение аппетита и, как следствие, снижение объема питания?

Нет – 0 баллов

Да – 1 балл

- Г) Оценка:

> 2 баллов – показана нутритивная поддержка

0-2 баллов – не показана нутритивная поддержка, проводится мониторинг.

- 3) Индекс массы тела по Кетле:

$$\text{Индекс массы тела по Кетле (ИМТ)} = \frac{\text{Масса тела (кг)}}{\text{Рост (м}^2\text{)}}$$

Норма – 21-25 кг/м<sup>2</sup>

Истощение отчетливое – до 20 кг/м<sup>2</sup>

Истощение значительное – до 17 кг/м<sup>2</sup>

Истощение предельное – до 16 кг/м<sup>2</sup>

## ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Обеспечивает попадание нутриентов в желудочно-кишечный тракт и поддерживает синтез белка, регуляцию обмена веществ в висцеральных органах, а также биохимических процессов, протекающих в стенке кишечника. Энтеральное питание поддерживает всасывательную функцию слизистой оболочки тонкой кишки и участвует в сохранении защитного барьера, отделяющего патогенные микроорганизмы кишечника от системной циркуляции.

### **Классификация смесей для энтерального питания**

1. Стандартные смеси
  - 1.1. Изокалорийные стандартные смеси.
  - 1.2. Изокалорийные стандартные смеси с пищевыми волокнами.
  - 1.3. Гиперкалорийные высокоэнергетические стандартные смеси
  - 1.4. Гиперкалорийные высокоэнергетические стандартные смеси с пищевыми волокнами.
  - 1.5. Высокобелковые стандартные смеси.
  - 1.6. Высокобелковые, высокоэнергетические стандартные смеси.
2. Пептидные (олигомерные) смеси

### **Питательные смеси для больных с нарушенными функциями ЖКТ**

3. Метаболически направленные смеси
  - 3.1. Смесы, предназначенные для больных с сахарным диабетом и стрессорной гипергликемией (типа «Диабет»).
  - 3.2. Смесы, предназначенные для больных с дыхательной недостаточностью (типа «Пульмо»).
  - 3.3. Смесы, предназначенные для больных с почечной недостаточностью (типа «Нефро»).
  - 3.4. Смесы, предназначенные для больных с печеночной недостаточностью (типа «Гепат»).
4. Специализированные смеси
  - 4.1. Для онкологических больных.
  - 4.2. Для больных туберкулезом.
  - 4.3. Для беременных и кормящих женщин.
5. Иммуномодулирующие смеси

### **Питательные смеси, предназначенные для больных с иммунодефицитными состояниями.**

6. Фармаконутриентные смеси

**Показания для назначения энтерального питания (ESMO/ESPEN 2011):**

Показания	Уровень доказательности*
Наличие недостаточности питания	C
Если пациент не принимал пищу более 7 дней	C
Неадекватный прием пищи (менее 60% от необходимого количества ккал в сутки более 10 дней)	C
Потеря массы тела вследствие недостаточного приема пищи	B

**Особенности энтерального питания при химио- и/или лучевой терапии.**

Особенности	Уровень доказательности*
Использование эндоскопических стом при опухолях пищевода, головы и шеи для профилактики мукозитов, нарушения глотания	C
Предпочтительнее использовать энтеральное питание, обогащенное фармаконутриентами (омега-3 жирные кислоты и др.) <sup>(2)</sup>	B
Использование перорального энтерального питания для профилактики потери массы тела и соблюдения плана лечения	C
Применение перорального энтерального питания, обогащенного омега-3 жирными кислотами и пищевыми волокнами для профилактики гастроинтестинальной токсичности <sup>(1)</sup>	B
При невозможности установки эндоскопической чрескожной гастро- или еюностомы может быть рассмотрен вопрос об установке назогастрального или назоэюнального зонда для проведения энтерального зондового питания	C
При диссеминированных процессах с целью уменьшения темпов потери массы тела <sup>(1)</sup>	C
Использование высокобелкового питания для сипинга является более предпочтительным	C
Не доказано влияние энтерального питания на рост опухоли	C
<p>3 Оценка эффективности нутритивной поддержки энтеральной смесью «Фортикер» у пациентов с онкологическими заболеваниями в период лучевой и химиотерапии/Вестник интенсивной терапии, №4, 2009, стр. 77-83</p> <p>4 «Targets nutrition support» and pharmacotherapy in cancer patients with anorexia-cachexia syndrome/31st ESPEN congress, abstr.108,p.71</p> <p>* Уровни доказательности:                      «А» высокий – (мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований)                      «В» средний – (когортные исследования и исследования типа случай-контроль)                      «С» низкий – (неконтролируемые исследования и консенсусы специалистов)</p>	

**Способы энтерального питания**

- Сипинг (sip feeding) – пероральный прием питательной смеси через трубочку мелкими глотками, при этом предпочтительно использовать специализированные смеси содержащие максимальное количество питательных веществ в минимальном объеме.

- Энтеральное зондовое питание (через назогастральный или назоинтестинальный зонд);
- Энтеральное питание через стому (чрескожную эндоскопическую, лапароскопическую, лапаротомную) при длительности более 3 недель.

### **Расчет энтерального питания**

1. Определение суточного объема калорий, необходимый для пациента, из расчета 20-25 ккал/на 1 кг массы тела/в сутки.
2. Определение характера энтерального питания:
  - а) в качестве дополнения к основному питанию;
  - б) в качестве основного источника питания.

### **Противопоказания к энтеральному питанию**

- непереносимость или анафилаксия на отдельные составляющие питания;
- ишемия кишечника;
- механическая острая кишечная непроходимость;
- острый живот;
- перфорация кишечника;
- сывороточный лактат  $>3$  ммоль/л (маркер ацидоза);
- гипоксия  $pO_2 < 50$  мм рт. ст.;
- $pCO_2 > 80$  мм рт.ст., ацидоз –  $pH < 7,2$ .

### **Противопоказания к энтеральному (оро-/назоинтестинальному)**

- зондовому питанию
- пищеводные стриктуры/дивертикулы;
- пищеводная обструкция;
- разрывы стенки пищевода;
- переломы носа.

### **Противопоказания для установки эндоскопических гастростом**

Абсолютные

- перитонит;
- коагулопатии;
- нет возможности для диафаноскопии;
- канцероматоз брюшины.

Относительные

- асцит;
- перитонеальный диализ;
- язва желудка.

## ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Под парентеральным питанием (ПП) понимают способ введения необходимых организму нутриентов непосредственно в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт.

Основные составляющие парентерального питания традиционно разделяют на две группы:

**Источники энергии** – растворы углеводов и жировые эмульсии.

Растворы глюкозы – 10%, 20%, 30%

Жировые эмульсии

1. Жировые эмульсии на основе длинноцепочечных триглицеридов (LCT).
2. Жировые эмульсии на основе смеси длинноцепочечных и среднецепочечных триглицеридов (MCT/LCT 50:50).
3. Жировые эмульсии на основе смеси длинноцепочечных и среднецепочечных триглицеридов с добавлением омега-3 жирных кислот (MCT/LCT/омега-3 жирные кислоты).
4. Жировые эмульсии на основе только рыбьего жира (омега-3 жирных кислот).

**Источники пластического материала** для синтеза белка – растворы кристаллических аминокислот.

1. Растворы аминокислот общего назначения.
2. Растворы аминокислот специального назначения.
  - Дипептиды глутамина
  - Растворы аминокислот для больных с печеночной недостаточностью
  - Растворы аминокислот для больных с почечной недостаточностью
  - Растворы аминокислот, предназначенные для детей

### Поливитаминовые комплексы для парентерального введения

1. Препараты водорастворимых витаминов.
2. Препараты жирорастворимых витаминов.
3. Препараты водо – и – жирорастворимых витаминов.
4. Комплексы микроэлементов для парентерального введения

### Комбинированные препараты для парентерального питания.

1. Комбинированные двухкомпонентные контейнеры «Два в одном» (раствор аминокислот + глюкоза).
2. Комбинированные трехкомпонентные препараты «Три в одном» (раствор аминокислот+глюкоза+жировая эмульсия).
3. Комбинированные трехкомпонентные препараты «Три в одном» (аминокислоты+глюкоза+многокомпонентная жировая эмульсия с включением омега-3 жирных кислот).

## Режимы парентерального питания

Круглосуточное введение сред:

- оптимально для больных в стационаре;
- наилучшая переносимость и утилизация субстратов;

Продленная инфузия в течение 18-20 часов:

- хорошая переносимость;
- в интервалах рекомендуется введение 5% глюкозы;

Циклический режим – инфузия в течение 8-12 часов:

- удобно при домашнем парентеральном питании;
- хорошая переносимость после периода адаптации.

## Системы парентерального питания

1. «Флаконная» – использование нескольких флаконов с аминокислотами, глюкозой и жировыми эмульсиями (по показаниям с добавлением фармако-нутриентов). Недостатки: требуется неодинаковая скорость введения растворов, выше риск введения несовместимых нутриентов, более часто возникают нарушения метаболизма (гипергликемия, электролитные нарушения и др.), трудоемкость (капельницы, коннекторы, флаконы), ниже антисептическая защита. К недостаткам применения данной методики также относят избыточную нагрузку на медицинский персонал при замене флаконов (иногда до 6-8 за сутки). Преимущества: гибкость дозирования для больного, возможность изменения программы парентерального питания при меняющейся ситуации.
2. «Все-в-одном» («два-в-одном», «три-в-одном») – мешки 2-х камерные (аминокислоты + глюкоза) или 3-х камерные (аминокислоты + глюкоза ± жировая эмульсия). Преимущества: высокая технологичность, удобство и простота применения; одновременное и безопасное введение всех необходимых нутриентов; оптимально сбалансированный состав; снижение риска инфекционных осложнений; возможность добавлять необходимые микронутриенты (витамины-микроэлементы); экономически менее затратная технология; снижение риска неблагоприятных эффектов, связанных с избыточным поступлением глюкозы; жировая эмульсия уменьшает раздражение вены путем снижения осмолярности питательной смеси; меньшая частота метаболических нарушений.

## Показания для назначения парентерального питания (ESMO/ESPEN 2011):

Показания	Уровень доказательности*
Недостаточность статуса питания	C
Неадекватное поступление пищи или неадекватное энтеральное питание (менее 60% от необходимого количества ккал в сутки более 10 дней)	C

**Особенности парентерального питания при химио- и лучевой терапии.**

Особенности	Уровень доказательности*
Парентеральное питание рекомендовано при гастроинтестинальной токсичности (мукозиты, диареи, энтериты, энтеропатии и др.)	В
При диссеминированном процессе способствует стабилизации и улучшению общего состояния	С
Использование 3-х компонентных систем «все-в-одном» является более предпочтительным, особенно для пациентов с кахексией	С
При явлениях холестаза может быть предпочтительным использование парентерального питания с высокой концентрацией омега-9 мононенасыщенных жирных кислот (5)	В
Проводиться на протяжении всего периода лечения и носит циклический характер от 6 до 12 часов	С
Не доказано влияние парентерального питания на рост опухоли	С
5 Garcia-de-Lorenzo A et al. BrJ.Nutr.2005; 94:221-230. *Уровни доказательности: «А» высокий – (мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований) «В» средний – (когортные исследования и исследования типа случай-контроль) «С» низкий – (неконтролируемые исследования и консенсусы специалистов)	

**Способы парентерального питания:**

- Парентеральное питание по «флаконной» методике
- Парентеральное питание по технологии «все-в-одном» + комплекс витаминов и минералов

**Расчет парентерального питания.**

1. Определить необходимое суточное количество ккал из расчета 20-25 ккал/кг массы тела/в сутки.
2. Уточнить по имеющейся на упаковке препаратов для парентерального питания общую калорийность (ккал) в 1л, 1,5л или 2л и выбрать необходимый объем.
3. Добавить препараты, содержащие комплекс витаминов и минералов

**Противопоказания к парентеральному питанию**

- анурия или гипергидратация без диализа;
- жировая эмболия (для жировых эмульсий);
- сывороточный лактат >3 ммоль/л, гипоксия рО<sub>2</sub> < 60 мм рт. ст.,
- рСО<sub>2</sub> > 80 мм рт.ст., ацидоз – рН < 7,2;
- непереносимость или анафилаксия на отдельные составляющие питания.

**Смешанное питание**

Энтеральное и парентеральное питание может назначаться пациенту одновременно при недостаточной эффективности одного из этих методов.