

Рак желудка

Доцетаксел, цисплатин, УФТ с лейковорином это эффективная и безопасная терапия запущенного рака желудка

Oh et al. Комбинация доцетаксела, цисплатина, УФТ с лейковорином в терапии запущенного рака желудка. Journal of Clinical Oncology, 2004 ASCO Annual Meeting Volume 22, No 14S 2004:4231

Дизайн исследования:

Рак желудка - это одно из самых распространенных злокачественных образований. Комбинация доцетаксела и цисплатина отличается высокой эффективностью в терапии этой патологии. Целью данного исследования была необходимость оценить эффективность и токсичность сочетания препаратов доцетаксел, цисплатин, УФТ с лейковорином в терапии запущенных форм рака желудка.

В исследовании участвовало 72 пациента в период с сентября 2001 по апрель 2003. Доцетаксел применяли в дозе 60 мг/м² в качестве в/в инфузии в течение 1 часа в день. Цисплатин применяли внутривенно в дозе 75 мг/м² после доцетаксела 1 раз в день. Капсулы УФТ в дозе 360 мг/м² вместе с лейковорином 45 мг/день применяли в течение 21 дня с семидневным перерывом. Схему терапии повторяли каждые 4 недели.

Результаты	Количество пациентов = 63
полная ремиссия	6 (9.5 %)
частичная ремиссия	25 (39.7 %)
суммарная частота ответа	49.2 %
среднее время для прогрессирования	27 недель

Побочные эффекты встречались в виде нейтропении 65.2 %, тошноты и рвоты в 17.9 %.

Заключение:

Доцетаксел, цисплатин, УФТ с лейковорином, подтвержденные гранулоцит- или гранулоцит-макрофагстимулирующий фактор, являются эффективным и приемлемым режимом терапии запущенного рака желудка.